

Contracepția globală

Danielle Hassoun MD
Chișinău, Republica
Moldova Mai 2015

Global

2

1,3 milioane femei aflate la vârsta fertilă (între 15-44 ani)

	Țările dezvoltate	Țările în curs de dezvoltare
Rata fertilității	< 2	4
Sarcini	28 milioane 13 milioane dintre care sunt sarcini neplanificate	182 milioane 65 milioane dintre care sunt sarcini neplanificate
Avorturi	5 milioane	13 milioane

Datele furnizate de OMS

3


	Nevoie nesatisfăcută de planificare familială %		Prevalența contraceptivelor (%)		Asigurare cu îngrijire prenatală –cel puțin o vizită	Asigurare cu îngrijire prenatală –cel puțin patru vizite	Nașteri asistate de personal medical calificat (%)	Nașteri prin operație cezariană (%)
	2011	2010	2011	2010	2009	2009	2009	2008
Regiunea OMS								
Africa	24.7	24.7	27.2	26.9	73.9 [↓]	43.4 [↓]	48.9 [↓]	3.8 [↓]
America	9.3	9.2	73.6	74.2	94.9 [↓]	85.9 [↓]	93.6 [↓]	35.6 [↓]
Africa de Sud-Est	13.7	14.0	59.4	58.6	75.8 [↓]	52.4 [↓]	59.3 [↓]	8.8 [↓]
Europa	10.4	9.7	69	70.7	96.0 [↓]	80.4 [↓]	97.5 [↓]	23.0 [↓]
Est-mediteraneană	19.8	20.2	46	45.4	70.1 [↓]	44.3 [↓]	63.1 [↓]	15.7 [↓]
Pacificul de Vest	5.7	5.6	79.7	80.0	93.2 [↓]	69.7 [↓]	91.8 [↓]	24.1 [↓]
Nivel global	12.3	12.3	63.2	63.3	80.5 [↓]	55.1 [↓]	70.0 [↓]	15.6 [↓]

Global

4

61 % din cupluri folosesc metode de contracepție

Cele mai populare metode de contracepție din lume
(studiul cuprinde 100 cupluri căsătorite care utilizează contraceptive, an. 2000)



Sursa: Date ale Națiunilor Unite, Diviziunea Populației, Utilizarea contraceptivelor în lume, 2003


Metodele de contracepție utilizate

diferă de la o țară la alta

- În țările din Asia și America Latină, precum și în țările anglo-saxone, cel mai frecvent, este utilizată sterilizarea.
Această metodă este mai puțin utilizată în Africa și țările din Europa de Sud (doar 1 cuplu din 10)
- DIU sunt utilizate pe larg în China, însă nu și în India. Chiar dacă în lume pilulele se bucură de o popularitate mare, în China și India acestea nu sunt utilizate.
- Japonia este unica țară în care prezervativul este cea mai populară metodă de contracepție.

Prevalența contraceptivelor în dependență de tipul metodei și țară

6





Prestarea serviciilor în Franța

Cadrul legal în Franța

8

- 1967 legea Neuwirth : Autorizează contracepția
- 1974: Contracepția este compensată (70%)
- 1975 : Legea Veil cu privire la avort
 - Până la 12 săptămâni de sarcină
 - Femeile aflate într-o situație de primejdie pot solicita un avort
 - La cerere
 - 7 zile constituie perioada de așteptare, sondaje sociale obligatorii
 - Avortul trebuia efectuat doar în spitale publice ori private
 - Pentru persoanele minore este nevoie, în mod obligatoriu, de consimțământul părinților

Cadrul legal în Franța

9

- În 1979 a fost confirmată legea adoptată în 1975 și suplimentar, se specifică ideea că spitalele publice trebuie să deschidă centre de avort. (Obiecția pe motive de conștiință se referă doar la furnizorii individuali de servicii medicale, nu și la instituțiile de stat sau publice)
- 1982 – avortul este compensat(70%)
- 1988 - este comercializat mifepristonul

Cadrul legal în Franța

10

- 2001: Legea cu privire la avort este revizuită
 - Până la 14 săptămâni de sarcină
 - Posibilitatea efectuării avortului în afara spitalului (centru privat, centre de îngrijire primară, centre de planificare familială)
 - Consimțământul parental nu mai este obligatoriu nici pentru avort, și nici pentru contracepție
 - Sondajul social nu mai este obligatoriu
 - Contraceptivele de urgență pot fi eliberate fără prescripție medicală
 - Este autorizată atât sterilizarea feminină cât și cea masculină; Este eliminată condiția cu privire la vârstă și numărul de copii, unica condiție fiind perioada de așteptare de 4 luni

Cadrul legal în Franța

11

- 2013 : compensarea avortului de până la 100%
- 2014 : Condiția de aflare într-o situație de primejdie pentru a solicita un avort nu mai este o prevedere legislativă
- 2014: În instituțiile private, contracepția (toate metodele și consultația) este gratuită pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani.

Anterior, contracepția era gratuită doar în centrele de planificare familială, fără limită de vârstă.

- 03/2015:
 - fără perioadă de așteptare înainte de avort
 - Avortul chirurgical va fi posibil și în centrele de îngrijire primară
 - Moașele pot efectua avortul prin tratament medicamentos

Contracepția de urgență (CU)

12

Din 1999/2001

- Contracepția de urgență (levonorgestrel) și medicamentele fără prescripție (Over-the-counter)
- Levonorgestrelul și ulipristalul sunt compensate, în baza unei prescripții

Pentru minori (fără consimțământul parental)

- În farmacii, eliberarea contraceptivelor este gratuită și nu necesită prescripție medicală
- Poate fi oferită de către asistenta medicală din școală sau poate fi obținută în cadrul centrelor de planificare familială

Cine poate elibera contraceptive?

13

- Medicii (medicii generalişti, ginecologii sau alţii) în cadrul instituţiilor private sau publice, centrelor de îngrijire primară, centrele de planificare familială.
- Moaşele (din 2009) pot prescrie toate metodele de contracepţie şi, de asemenea, sunt autorizate să introducă implanturi şi sterilete atunci când femeile sunt într-o stare bună de sănătate, acestea însă, trebuie să le direcţioneze către medic în cazul în care este necesară analiza sângelui.
- Farmaciştii (2009) pot vinde pilule pentru o perioadă de încă 6 luni în cazul în care termenul prescripţiei a expirat, iar aceasta a fost eliberată cu mai puţin de un an în urmă.
- Asistentele medicale (2009) pot prescrie pilule pentru o perioadă de încă 6 luni, în cazul în care termenul prescripţiei a expirat, iar aceasta a fost eliberată cu mai puţin de un an în urmă.



Prevalența metodelor de contracepție în Franța

Sondajul « Fécond »

Populația și societățile Septembrie 2012 și 2014. Bajos și alții

15

- 3 % din femei nu utilizează nici o metodă de contracepție și, în același timp, nu vor să rămână însărcinate
- Pilula este cea mai populară metodă de contracepție. O femeie din două folosește pilulele. (41%).
- Din 2010, se observă o tendință de descreștere a acestei metode, care este compensată parțial de utilizarea inelului, plasturelui și implantului.
- Metode de creștere a gradului de conștientizare asupra fertilității : 6% (stabil)
- Utilizarea prezervativului este în creștere (60 % de persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 -17 ani, iar 15% le combină cu pilulele)
- Sterilizarea: 3.9 % din femei
0,3% din bărbații chestionați

Sondajul « Fécond »

Populația și societățile Septembrie 2012 și 2014. Bajos și alții

16

- Prevalența dispozitivelor intrauterine : 21,4 %
 - S-a mărit în ultimii 5 ani
 - Legată de vârstă și paritate

- Furnizorii și femeile rămân reticenți față de această metodă:
 - 41% dintre ginecologi obstetricieni și 43% dintre medicii generalişti consideră că DIU sunt contraindicate femeilor nulipare
 - 83% **au temeri** de infecții, 53% - de sarcini ectopice
 - 56% dintre femei consideră că această metodă nu poate fi utilizată de către femeile **nulipare și poate acționa negativ asupra fertilității**

Cu vârsta mai mică de 25 ani	1%
Cu vârsta de peste 30 ani	30%
Nulipare	3%
1 copil	20%
2 copii	40%


Moreau C, Bohet A, Hassoun D, Ringa V, Bajos N, FECOND group. IUD use in France: women's and physician's perspectives. Contraception 2014; 89:9–16./ Utilizarea DIU în Franța

Sondajul « Fécond »

Populația și societățile Septembrie 2012 și 2014. Bajos și alții

17

Metodele de contracepție utilizate în Franța. Evoluția în perioada 1978 - 2010



▪ bărbatul sau femeia

*** Retragerea, abstinerea periodică, metodă locală, alta, nu știe

*** Implantul, plasturele, inelul vaginal

Sursele: Ancheta Mondială cu privire la Fertilitate (1978). Ancheta cu privire la controlul nașterilor (1988). Ancheta cu privire la situația familială și angajarea în câmpul muncii (1994). Ancheta CoCon (2000). Ancheta Fécond (2010).


Eșantion: femei cu vârsta cuprinsă între 20 și 44 ani, care locuiesc în Franța metropolitană, care nu sunt sterile ori însărcinate, care întrețin raporturi sexuale și care nu-și doresc copii.

Sondajul « Fécond »

Populația și societățile Septembrie 2012 și 2014. Bajos și alții

18

Metodele de contracepție utilizate în Franța în 2013, după vârsta femeilor



* Implant, inel vaginal, plastru

** Retragere, abținere periodică, metodă locală

(N. Bajos et al., *Population & Sociétés*, n° 511, Ined, mai 2014)

Sursa: Ancheta Fécond (2013), Inserm-Ined.

Eșantion: Femei cu vârsta cuprinsă între 15-49 ani, care locuiesc în Franța metropolitană, care nu sunt nici sterile, nici însărcinate, care întrețin rapoarte sexuale heterosexuale și care nu-și doresc copii (fie 75% din ansamblul de femei de 15 - 49 ani)

Sarcinile neplanificate și avortul


19

- Rata de avort este stabilă: 14,5 /1000 femei
- 35% vor recurge la avort, cel puțin o dată în viață
- Descreșterea ratei sarcinilor neplanificate (46% în 1978 față de 33% în 2000), însă se observă o frecvență mai mare a avorturilor când sarcina este neplanificată: 4/10 în 1975 față de 6/10 în 2000
- 1/3 sarcini neplanificate sunt legate de nefolosirea unei metode de contracepție (temporar), iar 46% din cauza utilizării necorespunzătoare

(Goulard, Cocon Contraception 2006)

Rata avorturilor joasă și stabilă de mai bine de 30 ani

20




Rata avorturilor în dependență de vârstă

21

Evoluția ratei avortului, în dependență de vârstă

Numărul avorturilor raportat la 1000 femei




Eșantionul: Franța metropolitană

Surse: DREES (SAE), CNAM-TS (SNIIRAM: numărul de loturi de medicamente rambursate, în regim normal, după data de lichidare, înainte de 2010, toate regimurile, după data utilizării, din 2010); INSEE (ELP).

Proceduri chirurgicale și medicamentoase

22

Evoluția repartizării avorturilor, în dependență de metoda de intervenție




Surse: SAE, PMSI, CNAM-TS (Erasmus v1, cheltuielile pentru întreruperi de sarcină rambursate)
Eșantionul: Franța metropolitană

	1991	2001	2012
Avorturi medicamentose	13 %	29,7 %	57 % 15% în afara spitalului

Avorturile în Europa

23

Recurgerile la întreruperi de sarcină în Europa



Sursele: OMS - Datele cu privire la starea sănătății din Europa (HFA-DB) Organizația Mondială a Sănătății. Biroul Regional pentru Europa.

Frecvența avorturilor de la 6.0 la 25.8 raportate la 1.000 de femei

Contracepția și rata avorturilor în Franța « paradoxul francez » încă persistă

24

- Prevalența înaltă a contraceptivelor

Mai puțin de 5 % din femei nu utilizează metode contraceptive și totodată nu-și doresc să rămână însărcinate

- Creșterea numărului de metode medicamentoase utilizate (contracepția hormonală și DIU) și acces foarte larg la contracepția de urgență.

Însă

- Nu se înregistrează o descreștere a ratei avorturilor (stabilă de mai mult de 25 ani).

Leridon H, Oustry P, Bajos N și echipa COCON
Populație și societăți 2002 ; 381:1-4

Concluzie

25

În pofida utilizării pe scară largă a metodelor de contracepție, controlul fertilității pare să rămână o problemă, iar controlul perfect al fertilității, pe termen lung, este dificil de îndeplinit